

Словарь

Антиретровирусная терапия - лечение, направленное на подавление активности ВИЧ; см. – высокоактивная антиретровирусная терапия.

Антитела к ВИЧ - антитела к различным белкам ВИЧ (антигенам), возникающие в организме в ответ на инфицирование ВИЧ исохраняющиеся практически весь период инфицирования, что позволяет широко использовать качественные методы обнаружения этих антител для доказательства состояния инфицированности (заражения) человека ВИЧ; антитела к различным антигенам ВИЧ имеют разное диагностическое значение и определяются с помощью иммунного блоттинга; наиболее специфичными для диагностики инфекции, вызываемой ВИЧ, являются антитела к гликопротеидам ВИЧ (с молекулярным весом 41, 120 и 160 килодальтон).

Больной СПИДом человек, у которого диагностировано одно или несколько заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным болезням; иногда термин ошибочно переносится на всех больных ВИЧ-инфекцией или ВИЧ-позитивных лиц.

Вертикальная передача ВИЧ - передача ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Вирус иммунного дефицита человека

§ вирус иммунодефицита человека;

§ ВИЧ;

§ вирус, вызывающий СПИД;

Вирусная нагрузка - количественный показатель присутствия вируса в крови; высокий уровень вирусной нагрузки имеет плохое прогностическое значение; уровень снижения вирусной нагрузки на фоне проводимой терапии свидетельствует о степени ее эффективности

ВИЧ-1 вирус иммунного дефицита человека первого типа, главный этиологический агент современной пандемии ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-2 вирус иммунного дефицита человека второго типа; чаще встречается в странах, которые были колониями Португалии (Гвинея-Бисау, Ангола, Мозамбик и др.); близкий к ВИЧ-2 вид обнаружен у обезьян; считается, что прогрессирование иммунного дефицита, вызываемого ВИЧ-2, несколько медленнее, чем при заражении ВИЧ-1.

ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека; соответствует употребляемому в МКБ-10 термину «заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека».

ВИЧ-инфицированный (человек) – человек, зараженный ВИЧ, независимо от стадии ВИЧ-инфекции;

§ ВИЧ-позитивный (предпочтительная форма);

§ ВИЧ-серопозитивный;

§ позитивный к ВИЧ;

§ носитель ВИЧ;

§ человек, живущий с ВИЧ (нейтральная, предпочтительная форма);

§ иногда употребляется в противоположность «больному СПИДом», применительно к лицам без выраженных клинических признаков ВИЧ-инфекции; – см. – носитель ВИЧ.

ВИЧ-позитивный (человек) – человек, имеющий «положительную» реакцию на ВИЧ;

§ человек, в крови которого обнаруживаются антитела к ВИЧ;

§ человек, живущий с ВИЧ.

ВИЧ-серопозитивный - человек, у которого обнаружены антитела к ВИЧ; см.ВИЧ-инфицированный.

Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) - комбинированная антиретровирусная терапия тремя или более разными препаратами, подавляющими активность ВИЧ, целью которой является полное подавление репликации ВИЧ.

Гепатит В - инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита В; часто встречающаяся ко-инфекция у инфицированных ВИЧ наркопотребителей.

Гепатит С - инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита С; часто встречающаяся сочетанная инфекция у инфицированных ВИЧ наркопотребителей.

Иммунный блоттинг - вариант иммуноферментной диагностики ВИЧ-инфекции, при котором определяются антитела к антигенам ВИЧ, предварительно распределенным по молекулярному весу с помощью фореаза (обычно в виде полос, расположенных в виде линий); при проведении иммуноферментного анализа линии антигенов, к которым обнаруживаются антитела, окрашиваются; наиболее специфичными для диагностики инфекции, вызываемой ВИЧ, являются антитела к гликопротеидам ВИЧ (для ВИЧ-1 с молекулярным весом 41, 120 и 160 килодальтон).

Инкубационный период ВИЧ-инфекции – период от заражения ВИЧ до появления клинических проявлений (острой) ВИЧ-инфекции;

– период от заражения до появления лабораторных маркеров ВИЧ-инфекции.

Инфицирование ВИЧ

§ непосредственный процесс заражения ВИЧ;

§ проникновение ВИЧ в организм человека.

Паллиативная помощь (в контексте ВИЧ-инфекции) - помощь ВИЧ-позитивным лицам, уменьшающая их страдания, связанные с проявлениями ВИЧ-инфекции и ее осложнений; понятие включает психологическую поддержку, обезболивание, хирургические вмешательства и т. п. в период угасания жизненных функций, а также оказание психологической помощи родственникам и близким умирающих ВИЧ-позитивных лиц; иногда термин используется, включая оказание всей медико-социальной помощи ВИЧ-позитивным лицам и их семьям, исключая лишь этиотропную терапию ВИЧ-инфекции и сопутствующих инфекций.

Пандемия ВИЧ-инфекции - глобальное распространение ВИЧ (преимущественно ВИЧ-1).

СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита;

§ финальная стадия ВИЧ-инфекции, диагностируемая по появлению опасных для жизни оппортунистических заболеваний, определяемых согласно принятой в настоящее время классификации СПИД-индикаторных заболеваний и состояний;

§ совокупность симптомов, связанных с глубоким нарушением иммунной системы организма, произведенным ВИЧ;

§ иногда неправильно используется для обозначения ВИЧ-инфекции.

СПИД-сервисные организации - любые организации, участвующие в проведении профилактики ВИЧ-инфекции, лечении ВИЧ-инфицированных, оказании им социальной или юридической поддержки.

Эпидемия ВИЧ-инфекции - распространение ВИЧ-инфекции в масштабах ограниченной территории или части населения.